Задача 9-1

Опыт 1. Получение водорода и его свойства

- 1) Составьте уравнения реакций: а) получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой; б) взрыва гремучей смеси.
- 2) Какой объём водорода при нормальных условиях необходимо закачать в воздушный шарик, оболочка которого имеет массу 0,7 г чтобы он начал подниматься вверх?

Опыт 2. Горение железа в кислороде

- 1) Составьте уравнения реакций: а) получения кислорода разложением перманганата калия; б) горения железа в кислороде.
- 2) Зачем к булавке при выполнении этого опыта прикрепляют кусочек лучинки?

Опыт 3. Получение и свойства углекислого газа

- 1) Составьте уравнения реакций: а) получения углекислого газа при взаимодействии мрамора с хлороводородной кислотой; б) взаимодействия углекислого газа с раствором щёлочи.
- 2) Почему кожа ладони втягивается в колбу?

Опыт 4. Аммиачный фонтан

- 1) Составьте уравнение равновесного процесса растворения аммиака в воде.
- 2) Почему в колбу бьёт фонтан?

Опыт 1. 1) $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$; $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ 2) $V(H_2) = 22,4 \cdot 0,7 / (29-2) = 580$ мл. (около 600 мл)

Опыт 2. 1) $2KMnO_4 = K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$; $3Fe + 2O_2 = Fe_3O_4$. 2) Лучинка играет роль зажигалки.

Опыт 3. 1) $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$; $2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$. 2) возникает разряжение за счёт поглощения газа щёлочью.

Опыт 4. 1) $NH_3 + H_2O = NH_3 \cdot H_2O = NH_4^+ + OH^-$ 2) Возникает разряжение за счёт растворения газа в воде.

За каждое уравнение реакции по 1 баллу, За каждое объяснение по 1 баллу. Всего 8 баллов

Задача 9-2

120 г смеси железной окалины (Fe_3O_4) и свинцового сурика (Pb_3O_4) обработали избытком концентрированной горячей соляной кислоты. При этом выделилось 448 мл газа (при н.у.). Определите массу железной окалины в смеси. (5 баллов)

Количество вещества хлора составит $0,448/22,4 = 0,02$ моль. Тогда количество вещества свинцового сурика будет 0,02 моль, а его масса $0,02 \cdot 685 = 13,7$ г. (1 балл) Масса железной окалины составит $120 - 13,7 = 106,3$ г. (1 балл)

Задача 9-3

Юный химик изучал зависимость растворимости хлорида калия (в граммах KCl на 100 грамм H_2O) от температуры. Один из экспериментов был выполнен некорректно, и в составленную им таблицу вкралась ошибка.

Растворимость (г KCl / 100 г H_2O), при:					
0 °C	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
27,6	36,2	40,0	45,5	51,1	56,7

1. Исправьте ошибку.
2. Определите растворимость хлорида калия при 48 °C
3. Рассчитайте массовую долю хлорида калия в насыщенном при 100 °C растворе.
4. Рассчитайте массу соли, которая выпадет в осадок при охлаждении 100 г насыщенного при 80 °C раствора хлорида калия до 0 °C. (6 баллов)

1. Построить график зависимости растворимости хлорида калия от температуры, (1 балл) он представляет собой прямую линию, найти точку, отклоняющуюся от прямой и исправить ошибку при 20 °C растворимость хлорида калия составит 34,5 г / 100 г воды. (1 балл)

- По графику определить растворимость хлорида калия при $48\text{ }^{\circ}\text{C}$ составит $42,3\text{ г} / 100\text{ г}$ воды. (1 балл)
- $W(100\text{ }^{\circ}\text{C}) = 56,7 / (100 + 56,7) = 36,18\%$. (1 балл)
- $W(80\text{ }^{\circ}\text{C}) = 51,1 / (100 + 51,1) = 0,3382$; $W(0\text{ }^{\circ}\text{C}) = 27,6 / (100 + 27,6) = 0,2163$;
Тогда $0,2163 = (100 \cdot 0,3382 - x) / (100 - x)$, (1 балл) откуда $x = 15,55\text{ г}$. (1 балл)

Задача 9-4

Для получения высокочистых металлов используют метод йодидного рафинирования. Неочищенный металл нагревают в вакуумированном сосуде с небольшим количеством йода. Пары образующегося при этом галогенида соприкасаются с раскалённой до $1400\text{ }^{\circ}\text{C}$ титановой или вольфрамовой нитью и разлагаются. Очищенный металл осаждается на нити в виде крупных кристаллов.

- При разложении $68,61\text{ г}$ йодида металла образуется $17,85\text{ г}$ металла. Установите металл.
- Что вы знаете о его использовании в ядерных реакторах? (5 баллов)

$2MeI_x = 2Me + xI_2$; (1 балл) Обозначим молярную массу металла «**Me**». Составим алгебраическое уравнение: $68,61 / (Me + 127 \cdot x) = 17,85 / Me$. (1 балл) Решая уравнение получаем $Me = 44,66 \cdot x$. (1 балл) При $x = 4$, $Me = 178,6$; Металл — гафний. (1 балл) Используется как замедлитель нейтронов в ядерных реакторах. (1 балл)

Задача 9-5

При прокаливании смеси нитрата натрия и нитрата меди (II) объёмы выделившихся газов кислорода и оксида азота (IV) оказались равными.

- В каких молярных соотношениях были взяты нитраты?
- На сколько процентов уменьшается масса смеси при полном разложении нитратов?
- Какие массы нитратов необходимо взять для приготовления 100 г смеси? (6 баллов)

- $2NaNO_3 = 2NaNO_2 + O_2$; $2Cu(NO_3)_2 = 2CuO + 4NO_2 + O_2$. (1 балл) Как видно из уравнений реакций для того, чтобы объёмы газов стали равными нужно взять 6 моль нитрата натрия на 2 моль нитрата меди, то есть $n(NaNO_3) : n(Cu(NO_3)_2) = 3 : 1$. (1 балл)
- Масса 6 моль нитрата натрия и 2 моль нитрата меди равна $(85 \cdot 6 + 188 \cdot 2) 886\text{ г}$. Масса улетевших газов равна $(4 \cdot 46 + 4 \cdot 32) 312\text{ г}$. Тогда потеря массы составит $312 / 886 = 0,3521$ или $35,21\%$. (2 балла)
- Для приготовления смеси возьмём x моль нитрата меди и $3x$ моль нитрата натрия. Тогда массы нитратов составят $188x$ и $3x \cdot 85$ г соответственно. $188x + 3x \cdot 85 = 100$, откуда $x = 0,2257$ моль. Таким образом масса нитрата меди равна $188 \cdot 0,2257 = 42,44\text{ г}$, а масса нитрата натрия $100 - 42,44 = 57,56\text{ г}$. (2 балла)